

Kultúra	Károsító	Kijuttatandó permetlé töménysége
Gyümölcsös, szőlő őszi – tavaszi lemosásban	lisztharmat, pajzstetű, levéltettűtűzők, körtelevel bolha, atkákártevők gyérítése, kultúrától függően cséppenésig	2-3%
Szőlő	lisztharmat vegetációban	0,5 - 1,0%
Alma	takacsatkák gyérítésére vegetációban	0,5 - 1,0%
Ribizske, málna, köszméte, fekete bodza Szamóca	takacsatkák, levéltetvek, pajzstetvek, áttelelő alakok ellen vegetációban atkák, levéltetvek (vegetációban)	2,0 - 3,0%, 0,5 - 1,0%, 0,5 - 1,0%
Szedér	szederátka áttelelő alakok ellen vegetációban	2 - 3% 0,5 - 1,0%

Házi kerti felhasználás:

- 0,5 – 1,0 dl / 6 – 12 liter víz/100 m² (szőlő, alma – vegetációban)
- 2,0 – 3,0 dl / 6 – 9 liter víz/100 m² (ribizske, málna, köszméte, szeder, fekete bodza – áttelelő alakok ellen)
- 0,5 – 1,0 dl / 10 liter víz → 4 – 5 liter/100 m² (szamóca vegetációban)

Előírt növényvédelmi technológia:

Almában, szilvában, kőrtében rügykibúrástól a zöldbimbós állapotig 0,25-0,5 l készítmény, öszi/árnyékban rügytalanúság 0,25-0,5 l készítmény, rügytalanúsági zöldbimbós állapotig 0,25-0,5 l készítmény, rügytalanúsági gyapotos állapotig 0,25-0,5 l készítmény, mennyiség 10 liter permetlében.

Szőlőben, vegetációban a készítményt a fertőzésveszély időszakban preventív jelleggel, legkésőbb az első tünetek megjelenésekor kell kijuttatni, és a fertőzés veszélytől függően 7-12 napos időközönként szükség szerint (legfeljebb 5 alkalommal) célszerű megismételni. Melegebb/szárazabb időjárásnál alacsonyabb szer koncentráció és magasabb víz mennyiség használata ajánlott. Súlyos fertőzésveszély fennállásakor a rövidebb (7-10 napos) permetezési forduló és a magasabb koncentráció alkalmazása ajánlott. A permetlé mennyiségét a lombozat nagyságától függően kell megválasztani, mert minden esetben törekedni kell az egyenletes és teljes permetelődésre, még a lombzat belsejében is.

Almában a készítményt a felszaporodó takacsatkák gyérítésére a tavaszi időszakban 7-10 naponta, 2-3 alkalommal megismételve célszerű alkalmazni. A készítménynek almafa-lisztharmat ellen kedvező mellékhatása van.

Ribizske, málna, köszméte, szeder, fekete bodza kultúrákban takacsatkák, levéltetvek pajzstetvek, szederátka áttelelő alakjai ellen a védekezést ősszel lombhullás előtt, tavasszal rügytalanúsági kezdés, majd elvegyezés után, alacsonyabb mennyiséggel, lemosószerezten. Vegetációban, állománykezelésként, takacsatkák, levéltetvek, pajzstetvek károsító alakjainak gyérítésére, 7-10 naponta 2-3 alkalommal megismételve célszerű alkalmazni. Az alkalmazandó koncentrációt az áttelelő alakok egyedszámától, illetve vegetációban a fertőzés erősségétől függően célszerű kiválasztani.

Szederben szederátka áttelelő alakok gyérítésére rügytalanúságot, illetve bimbós állapotban és virágzás kezdetén javasolt kijuttatni. A védekezőket rügynyílásig az áttelelő növények és az általuk lerakott tojások ellen, illetve a kártévő mirigyszármak időszakban, bimbós állapotban és a virágzás kezdetén kell elvegyezni addig, amíg a mirigő egyedek a vakkóknál meg nem telepednek.

Szamócaban atkák, levéltetvek ellen tenyészidőszakban szükség szerinti ismétléssel teljes borítást biztosító permetlé-mennyiséggel kijuttatva. A készítmény belekeverhető a bogdos gyümölcsös kultúrák környezetkímélő integrált növényvédelmi technológiájába.

A készítményt *fogmentes időszakban kell kijuttatni*. A szer hatását rontja a túl korai kijuttatás, amikor a kórokozók fejlődése és a károsító mozgása még nem indult meg, valamint a kezeletlen utáni túl nagy mennyiségű csapadék, amely a szeret lemoshatja.

A permetezések elvégzése a nyári időszakban a kora hajnalra, vagy a késő esti órákban szükséges minden esetben 25 °C alatti hőmérsékleti viszonyoknál. 25 °C feletti alkalmazása perszeiellyel jár. A bekevert permetlevelet az elkészítés napján fel kell használni.



NEVIKÉN®

EXTRA

ROVAR- ÉS GOMBAÖLŐ PERMETEZŐSZER

Emulzióképző koncentrátum (EC)

Hatóanyag: paraffinolaj 58 % (m/m), poliszulfidkén 7% (m/m)


Forgalmazási kategória: III

Engedély tulajdonosa, gyártja, kizserele és forgalomba hozza:

Corax-Bioner Biotechnológiai Zrt.

1119, Budapest, Etele út 57.

www.corax-bioner.hu



A KÉSZÍTMÉNY EMERRE, ÁLLÁRA, KÖRNYEZETRE VALÓ VESZÉLYESSÉGE ÉS A BIZTONSÁGOS FELHASZNÁLÁSNAK ELŐÍRÁSAI

Vízi szervezetekre való veszélyessége: nem jelölésköteles

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

A készítmény p.p.LD 50 értéke (patkány): >3869 mg/ttkg

H304 Lenyelve és légutakba kerülve halálos lehet.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

P280 Védőkesztyű/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P305 + P351 + P338 – SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:

Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P301+P310 – LENYELÉS ESETÉN:

Azonnal forduljon a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

P331 TILOS hánytatni.

P405 Elzárva tárolandó.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladékként való szállítás szükséges. A kiürült csomagolóeszköz települési hulladékként kezelhető.

H031 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.



Könyöleges 5 mondatok:

SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközeivel ne szennyezze a vizeket! (A bevezetést vagy az utakon lévő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést)

SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságtartson tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (lehetőleg zárt gyepr) biztonsági övezetet!

Egyéb környezetvédelmi előírások:

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéssel függően használható.

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap;

Élelmezés – egészségügyi várakozási idő: gyümölcs – szőlő kultúrában előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs;

Munkaegészségügyi övrendszabályok: egyéni védőfelszerelés – előkészítők és kijuttatók: védőruha, védőkesztyű, sav elleni védőszemüveg, védőállók.

Élelmezési előírások, terápia: Mérgezősúlyos, vagy annak gyanúja a munkát azonnal fel kell szüntetni, majd helyszíni elsősegélynyújtás után (lásd: lúg- és savanyólúg mérgezés) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. Tüneti – megfigyelés kezelési

Ellenanyagok: specifikus antitüdőmunka nincs.

Mérgezősúlyos, vagy annak gyanúja az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld szám: 06 80 201 199.

A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrafelhasználása tilos!

Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette. Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

Engedély száma: 21294/1996 FVM

04/2/6496-1/2012 NEBIH

15848/2013 NEBIH

Gyártási idő, szám: lásd a csomagoláson (év/hónap/napi)

A készítmény eltarthatósága: Eredei zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos fagymentes növényvédőzer raktárban 2 év.

Nettó tartalom: 0,5 l

Gyártói ajánlás: Lúgos kémhatásra és poliszulfidra érzékeny növényvédő szerekkel nem keverhető. Réztartalmú növényvédő szerekkel előzetes keverési próba elvégzése javasolt.

A készítmény a réz és alumíniumtartalmú eszközöket károsítja. Bőrözgató, súlyos nyálkahártya károsító, illetve allergizáló hatása lehet. A felbontható gőnyővel tartalmát lehetőleg naradéktalanul fel kell használni. Kombinációs partner tartályba való bekeverését megelőzően, a változó körülmények miatt minden esetben előzetes keverési próbát elvégezni. Olajoktartalmú termékekkel nem keverhető magas nitrogén tartalmú műtrágyákkal, sem réztartalmú lombtrágyákkal továbbá nedvesítőszert adalék hozzáadása sem javasolt.